

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fait le lien entre diabète et tuberculose

Mais, cette infection s'inscrit dans un cadre plus général : l'équipe suggère que les diabétiques pourrait «déprimer» le système immunitaire. Dans ce cadre, la tuberculose ne représente qu'un risque parmi d'autres.

Autre facteur de risque, les diabétiques ont plus de sucre dans le sang, ce qui favorise la croissance des bactéries et des germes qui se nourrissent de glucose.

Les auteurs recommandent un dépistage systématique du diabète chez les tuberculeux, et, pour les diabétiques exposés à la tuberculose d'un proche, un traitement préventif. La tuberculose, rappelons-le, reste la maladie bactérienne la plus répandue, avec 1.7 millions de morts en 2009.

Source : Bulletin de l'OMS, mai 2011

Une évaluation transversale révèle une prévalence de diabète élevée dans les cas de tuberculose nouvellement diagnostiqués

Blanca I Restrepo, Aulasa J Camerlin, Mohammad H Rahbar, Weiwei Wang, Mary A Restrepo, Izelda Zarate, Francisco Mora-Guzmán, Jesus G Crespo-Solis, Jessica Briggs, Joseph B McCormick & Susan P Fisher-Hoch

Auteur : Loïc Leroux

Crédit photo : © Dominique VERNIER - Fotolia.com